

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Acticam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Activyl	Indoxacarb	Blettunarlausn	195 mg/ml	QP53AX27	Á ekki við	Nei	
Activyl Tick Plus	Indoxacarb,Permethrinum INN	Blettunarlausn		QP53AC54	Á ekki við	Nei	
Advocate fyrir hunda	Imidaclopridum INN,Moxidectinum INN	Blettunarlausn		QP54AB52	Á ekki við	Já	
Advocate fyrir ketti	Imidaclopridum INN,Moxidectinum INN	Blettunarlausn		QP54AB52	Á ekki við	Já	
Aftovaxpur Doe	1 to 3 inactivated purified FMD virus(es) out of a set of 7 (multistrain)	Stungulyf, fleyti		QI02AA04	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Aivlosin	Tylvalosinum INN	Duft til inntöku	42,5 mg/g	QJ01FA92	Kjöt og innmatur: 2 dagar	Nei	
Aivlosin	Tylvalosinum INN	Forblanda fyrir lyfjablandað fóður	42,5 mg/g	QJ01FA92	Kjöt og innmatur: 2 dagar	Nei	
Aivlosin	Tylvalosinum INN	Kyrni	625 mg/g	QJ01FA92	Kjöt og innmatur: 2 dagar Fasönum má ekki sleppa í að minnsta kosti 2 daga eftir að meðferð er lokið. Dýralyfið má ekki gefa varpfuglum séu eggin nýtt til manneldis.	Nei	
Aivlosin	Tylvalosinum INN	Kyrni	625 mg/g	QJ01FA92	Kjöt og innmatur: 2 dagar. Dýralyfið má ekki gefa varpfuglum séu eggin nýtt til manneldis. Dýralyfið má ekki nota innan 14 daga fyrir upphaf varptímabils.	Nei	
Aivlosin	Tylvalosinum INN	Kyrni	625 mg/g	QJ01FA92	Kjöt og innmatur: 1 dagur	Nei	
Aivlosin	Tylvalosinum INN	Kyrni	625 mg/g	QJ01FA92	Kjöt og innmatur: 2 dagar	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Alizin vet.	Aglepristonum INN	Stungulyf, lausn	30 mg/ml	QG03XB90	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Alpha Ject 3000	Aeromonas salmonicida subs. Salmonicida AL 2017, Vibrio anguillarum serotype O1 AL 112, Vibrio anguillarum serotype O2 AL 104	Stungulyf, fleyti		QI10AB02	Núll gráðudagar	Já	
ALPHA JECT 5-3	Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, Vibrio salmonicida, Listonella anguillarum serotype O1, Listonella anguillarum serotype O2a, Moritella viscosa	Stungulyf, fleyti		QI10AB03	Núll gráðudagar.	Já	
Alvegesic vet.	Butorphanolum INN tartrat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN02AF01	Hross: Kjöt: Núll dagar Mjólk: Núll klst.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Alzane vet. 5 mg/ml stungulyf, lausn	Atipamezolum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QV03AB90	Á ekki við	Nei	
Amoxibactin vet	Amoxicillinum INN tríhýdrat	Tafla	250 mg	QJ01CA04	Á ekki við	Já	
Amoxibactin vet	Amoxicillinum INN tríhýdrat	Tafla	50 mg	QJ01CA04	Á ekki við	Já	
Amoxibactin vet	Amoxicillinum INN tríhýdrat	Tafla	500 mg	QJ01CA04	Á ekki við	Nei	
Aniketam vet	Ketaminum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QN01AX03	Nautgripir, sauðfé, geitur og hestar: Kjöt og innmatur: 1 dagur. Mjólk: núll dagar. Svín: Kjöt og innmatur: 1 dagur.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Animed vet	Chlortetracyclinum INN hýdróklóríð	Húðúði, dreifa	2,45 % w/w	QD06AA02	Kjöt og innmatur: Núll dagar Mjólk: Núll dagar Notið lyfið ekki á jógur dýra ef mjólk þeirra er ætluð til manneldis.	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar	
Antisedan vet.	Atipamezolum INN	hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QV03AB90	Á ekki við.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Apoquel	Oclacitinibum INN	Maleat	Tafla	16 mg	QD11AH90	Á ekki við	Já	
Apoquel	Oclacitinibum INN	Maleat	Tafla	3,6 mg	QD11AH90	Á ekki við	Nei	
Apoquel	Oclacitinibum INN	Maleat	Tafla	5,4 mg	QD11AH90	Á ekki við	Nei	
Apovomin vet	APOMORPHINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE	Stungulyf, lausn	3 mg/ml	QN04BC07			Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
AQUI-S vet.	ISOEUGENOL	Baðþykki, lausn til meðhöndlunar fiska	540 g/l	QN01AX94	Slátrun: 2 gráðudagar.		Já	
Asperix Vet	Hydrogen Peroxide	Baðþykki, lausn til meðhöndlunar fiska	49,5 % w/w	QD08AX01			Nei	
Atopica vet.	Ciclosporinum INN	Mixtúra, lausn	100 mg/ml	QL04AD01	Á ekki við.		Nei	
Attane vet	Isofluranum INN	Innöndunargufa, vökvi	1000 mg/g	QN01AB06	Hestar: Kjöt og innmatur: 2 sólarhringar Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til manneidis.		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
AviPro THYMOVAC vet.	Chicken anaemia virus (CAV)	Frostþurrkuð tafla		QI01AD04	Núll dagar.		Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Baycoxine vet	Toltrazurilum INN	Mixtúra, dreifa	50 mg/ml	QP51AJ01	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 63 dagar. Mjólk: Ekki má gefa lyfið mjólkandi dýrum ef mjólk þeirra er nýtt til manneldis. Svín: Kjöt og innmatur: 77 dagar. Sauðfé: Kjöt og innmatur: 42 dagar. Ekki má nota lyfið handa mjólkandi ám, sé mjólkinn ætluð til manneldis.	Já	
Baymite Vet.	Phoximum INN		500 mg/ml	QP53AF01	Fjarlægið egg fyrir meðferð. Fleygið eggjum sem orpin eru á meðferðardegi og á meðan meðferð stendur. Egg: 12 klst. Kjöt og innmatur: 25 dagar eftir seinni meðferð.	Nei	
Baytril vet.	Enrofloxacinum INN	Mixtúra, dreifa	25 mg/ml	QJ01MA90	Á ekki við	Nei	
Baytril vet.	Enrofloxacinum INN	Mixtúra, lausn	25 mg/ml	QJ01MA90	Kjöt og innmatur: 10 sólarhringar.	Já	
Baytril vet.	Enrofloxacinum INN	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QJ01MA90	Kjöt og innmatur: 30 sólarhringar (i.m. og i.v.).Mjólk: Ekki má nota lyfið handa kúm ef mjólk þeirra er nýtt til manneldis.Egg: Ekki má nota lyfið handa alifuglum ef ef egg þeirra eru notuð til manneldis.	Já	
Baytril vet.	Enrofloxacinum INN	Stungulyf, lausn	50 mg/ml	QJ01MA90	Sláturfurðir: 30 sólarhringar (i.m. og i.v.).Mjólk: Ekki má nota lyfið handa kúm ef mjólk þeirra er nýtt til manneldis.Egg: Ekki má nota lyfið handa alifuglum ef ef egg þeirra eru notuð til manneldis.	Já	
Baytril vet.	Enrofloxacinum INN	Tafla	150 mg	QJ01MA90	Á ekki við.	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Baytril vet.	Enrofloxacinum INN	Tafla	50 mg	QJ01MA90	Á ekki við.	Já	
belfer vet.	Iron (III) hydroxide dextran complex equivalent to elementary iron	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QB03AC	Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, geitur: Biðtími: Kjöt og innmatur: núll dagar Mjólk: núll dagar	Nei	
BelOcain vet.	Lidocainum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QN01BB	Hestar: Kjöt og innmatur: 5 dagar Mjólk: 5 dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Benestermycin vet.	Framycetinum INN súlfat, Benethaminum penicillinum INN, Penethamate Hydroiodide BAN	Spenalyf, smyrslí		QJ51RC25	Sláturafurðir: 9 sólarhringar. Mjólk: Ef lyfið er gefið a.m.k. 35 dögum fyrir burð má ekki nota mjólkina 36 klst. eftir burð. Ef lyfið er gefið 34 dögum fyrir burð eða nær burði má ekki nota mjólkina í 37 daga eftir meðferð.	Já	
Bimectin Horse Oral Paste	Ivermectinum INN	Pasta til inntöku	18,7 mg/g	QP54AA01	Ekki má slátra dýrum til manndis á meðan á meðferð stendur. Ekki má nýta sláturafurðir fyrr en 34 sólarhringum frá síðustu meðhöndlun.	Já	
Bluevac BTV8	Bluetongue virus inactivated serotype 8 strain BTV8/Bel/2006	Stungulyf, dreifa		QI04AA02	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Bovela		Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa	2 ml	QI02AD02	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi. Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur.
Bovilis Blue-8	Bluetongue virus inactivated serotype 8 strain BTV8/Bel/2006	Stungulyf, dreifa		QI02AA08		Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Bovilis BTV8	Inactivated Bluetongue virus serotype 8 in culture medium	Stungulyf, dreifa		QI04AA02	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	1000 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	112,5 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	112,5 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	1400 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	250 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	250 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	500 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Blettunarlausn	500 mg	QP53BE02	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Tuggutafla	1000 mg	QP53BX	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Tuggutafla	112,5 mg	QP53BX	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Tuggutafla	1400 mg	QP53BX	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Tuggutafla	250 mg	QP53BX	Á ekki við	Nei	
Bravecto	Fluralanerum INN	Tuggutafla	500 mg	QP53BX	Á ekki við	Nei	
Bravecto Plus	Fluralanerum INN,Moxidectinum INN	Blettunarlausn	112,5 mg/5,6 mg/skammt	QP54AB52		Nei	
Bravecto Plus	Fluralanerum INN,Moxidectinum INN	Blettunarlausn	250 mg/12,5 mg/skammt	QP54AB52		Nei	
Bravecto Plus	Moxidectinum INN,Fluralanerum INN	Blettunarlausn	500 mg/25 mg/skammt	QP54AB52		Nei	
BROADLINE	Fipronil,s-Methoprene,Eprinomectinum INN,Praziquantelum INN	Blettunarlausn		QP54AA54	Á ekki við	Já	
BTVPUR	BTV1 antigen	Stungulyf, dreifa		QI04AA02	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Bupredine vet	Buprenorphinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,3 mg/ml	QN02AE01	Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa hestum sem ætlaðir eru til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Busol	Buserelinum INN acetat	Stungulyf, lausn	0,004 mg/ml	QH01CA90	Nautgripir, hestar, kanínur Kjöt og innmatur: núll dagar Nautgripir, hestar Mjólk: núll dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Butomidor vet.	Butorphanolum INN tartrat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN02AF01	HESTAR Kjöt og innmatur: Núll dagar Mjólk: Núll klukkustundir	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Calci-kel vet. Kela	Calcii gluconas	Innrennslislyf, lausn		QA12AA03	Sláturafurðir: Núll dagar Mjólk: Núll dagar	Já	
Calcimag vet. Kela	Calcii chloridum, Magnesi chloridum	Innrennslislyf, lausn		QA12AX	Sláturafurðir: Núll dagar Mjólk: Núll dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Canaural	Framycetinum INN súlfat, Diaethanolaminum fusidas, Nystatinum INN, Prednisolonum INN	Eyrnadropar, dreifa		QS02CA01	Á ekki við	Já	Nafni breytt úr Fucidin comp. vet. 30.07.2007
Canergy vet.	Propentofyllinum INN	Tafla	100 mg	QC04AD90	Á ekki við.	Nei	
Canicaral vet	Carprofenum INN	Tafla	160 mg	QM01AE91	Á ekki við.	Já	
Canicaral vet	Carprofenum INN	Tafla	40 mg	QM01AE91	Á ekki við.	Já	
Canidryl	Carprofenum INN	Tafla	100 mg	QM01AE91	Á ekki við	Já	
Canidryl	Carprofenum INN	Tafla	20 mg	QM01AE91	Á ekki við	Já	
Canidryl	Carprofenum INN	Tafla	50 mg	QM01AE91	Á ekki við	Já	
Canigen L4	Leptospira Canicola, Leptospira Icterohaemorrhagiae, Leptospira Australis, Leptospira Grippotyphosa	Stungulyf, dreifa		QI07AB01	Á ekki við.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Canileish	Leishmania infantum ESP (excreted secreted proteins)	Frostþurrkað stungulyf, dreifa	100 míkróg	QI07AO01	Á ekki við.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Canizol vet	Ketoconazolum INN	Tafla	200 mg	QJ02AB02	Á ekki við	Nei	
Canizol vet	Ketoconazolum INN	Tafla	400 mg	QJ02AB02	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Cardalis	Benazeprilum INN hýdróklóríð, Spironolactonum INN	Tuggutafla	10 mg/80 mg	QC09BA07	Á ekki við	Nei	
Cardalis	Benazepril hydrochloride, Spironolactonum INN	Tuggutafla	2,5 mg/20 mg	QC09BA07	Á ekki við	Nei	
Cardalis	Benazepril hydrochloride, Spironolactonum INN	Tuggutafla	5 mg/40 mg	QC09BA07	Á ekki við	Nei	
Carepen vet	Benzylpenicillinprocainum	Spenalyf, dreifa	600 mg	QJ51CE09	Mjólk: 6 sólarhringar Sláturafurðir: 3 sólarhringar	Já	
Carprofelican	Carprofenum INN	Stungulyf, lausn	50 mg/ml	QM01AE91	Á ekki við.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Carprosan vet.	Carprofenum INN	Stungulyf, lausn	50 mg/ml	QM01AE91	Kjöt og innmatur: 21 sólarhringur Mjólk: Núll klst.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Cartrophen Vet	Natrii pentosani polysulfas INN	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QM01AX90	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Cefabactin vet	Cefalexinum INN mónóhýdrat	Tafla	1000 mg	QJ01DB01	Á ekki við.	Nei	
Cefabactin vet	Cefalexinum INN mónóhýdrat	Tafla	250 mg	QJ01DB01	Á ekki við.	Nei	
Cefabactin vet	Cefalexinum INN mónóhýdrat	Tafla	50 mg	QJ01DB01	Á ekki við.	Já	
Cefabactin vet	Cefalexinum INN mónóhýdrat	Tafla	500 mg	QJ01DB01	Á ekki við.	Já	
Cepedex	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,1 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Cepedex	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,5 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Cerenia	Maropitantum INN cíttrat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QA04AD90	Á ekki við	Já	
Cerenia	Maropitantum INN cíttrat	Tafla	16 mg	QA04AD90	Á ekki við	Nei	
Cerenia	Maropitantum INN cíttrat	Tafla	160 mg	QA04AD90	Á ekki við	Nei	
Cerenia	Maropitantum INN cíttrat	Tafla	24 mg	QA04AD90	Á ekki við	Nei	
Cerenia	Maropitantum INN cíttrat	Tafla	60 mg	QA04AD90	Á ekki við	Nei	
Chanazine 10%, vet.	Xylazinum INN	Stungulyf, lausn	10 %	QN05CM92	Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Chanazine 2%, vet.	Xylazinum INN	Stungulyf, lausn	2 %	QN05CM92	Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Mjólk: Lyfið má ekki gefa dýrum sem framleiða mjólk til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Cimalgex	Cimicoxibum INN	Tuggutafla	30 mg	QM01AH93	Á ekki við	Nei	
Cimalgex	Cimicoxibum INN	Tuggutafla	8 mg	QM01AH93	Á ekki við	Nei	
Cimalgex	Cimicoxibum INN	Tuggutafla	80 mg	QM01AH93	Á ekki við	Nei	
Circovac	Inactivated PCV2 active ingredient	Stungulyf, fleyti		QI09AA07	Núll dagar	Nei	
Clavubactin vet.	Amoxicillinum INN tríhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Tafla	250/62,5 mg	QJ01CR02	Á ekki við	Já	
Clavubactin vet.	Amoxicillinum INN tríhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Tafla	50/12,5 mg	QJ01CR02	Á ekki við	Já	
Clavubactin vet.	Amoxicillinum INN tríhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Tafla	500/125 mg	QJ01CR02	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Clevor	Ropinirolum INN hýdróklóríð	Augndropar, lausn í stakskammtailáti	30 mg/ml	QN04BC04		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Clindabactin	Clindamycinum INN hýdróklóríð	Tuggutafla	220 mg	QJ01FF01		Nei	
Clindabactin	Clindamycinum INN hýdróklóríð	Tuggutafla	440 mg	QJ01FF01		Nei	
Clomicalm	Clomipraminum INN hýdróklóríð	Tafla	20 mg	QN06AA04	Á ekki við	Nei	
Clomicalm	Clomipraminum INN hýdróklóríð	Tafla	5 mg	QN06AA04	Á ekki við.	Nei	
Clomicalm	Clomipraminum INN hýdróklóríð	Tafla	80 mg	QN06AA04	Á ekki við	Nei	
CLYNAV		Stungulyf, lausn		QI10AX		Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Coglapix	Actinobacillus pleuropneumoniae strain NT3, Actinobacillus pleuropneumoniae strain SZII, Actinobacillus pleuropneumoniae strain PO, Actinobacillus pleuropneumoniae strain U3, Actinobacillus pleuropneumoniae strain B4	Stungulyf, dreifa		QI09AB07	Biðtími: Núll dagar.	Nei	
Coliprotec F4	Escherichia coli O8:K871 (F4ac) - lifandi ómeinvirkar	Frostpurrað mixtúrduft, dreifa		QI09AE03	Núll dagar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Coliprotec F4/F18		Mixtúra, dreifa		QI09AE03	Núll dagar	Nei	
Combisyn	Amoxicillinum INN trínhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Stungulyf, dreifa	14,0/3,5 % w/v	QJ01CR02	Kjöt og innmatur: 42 dagar. Mjólk: 60 klukkustundir.	Já	

Heiti dýrallyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Combisyn	Amoxicillinum INN tríhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Tafla	250 mg	QJ01CR02	Á ekki við.	Já	
Combisyn	Amoxicillinum INN tríhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Tafla	50 mg	QJ01CR02	Á ekki við.	Já	
Combisyn	Amoxicillinum INN tríhýdrat, Acidum clavulanicum INN kalíum	Tafla	500 mg	QJ01CR02	Á ekki við.	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	1040 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	140 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	1620 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	180 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	270 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	425 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	665 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Comfortis	Spinosad	Tuggutafla	90 mg	QP53BX03	Á ekki við	Nei	
Contacera	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýrallyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
Contacera	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur = 15 sólarhringar; Mjólk = 5 sólarhringar Svín: Kjöt og innmatur = 5 sólarhringar Hestar: Kjöt og innmatur = 5 sólarhringar; Dýrallyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Convenia	Cefovecinum INN natríum	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	80 mg/ml	QJ01DD91	Á ekki við	Já	
Cortacare	Hydrocortisonum INN aceponat	Húðúði, lausn	0,584 mg/ml	QD07AC16		Nei	
Cortavance	Hydrocortisonum INN aceponat	Húðúði, lausn	0,584 mg/ml	QD07AC16	Á ekki við	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Cortico Veyxin	Prednisolonum INN acetat	Stungulyf, dreifa	10 mg/ml	QH02AB	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 35 dagar Mjólk: 24 klst. Hestar: Kjöt og innmatur: 53 dagar Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til manneidis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Coxevac	Coxiella burnetii strain Nine Mile phase 1	Stungulyf, dreifa		QI04AB	Kjöt, mjólk og innmatur: Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	112,5 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	12 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	225 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	450 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	48 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	56,25 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Credelio	Lotilanerum INN	Tuggutafla	900 mg	QP53BE04	Á ekki við.	Nei	
Cyclospray vet	Chlortetracyclinum INN hýdróklóríð	Húðúði, dreifa	78,6 mg/g	QD06AA02	Kjöt og innmatur: Núll dagar Mjólk: Nnúll klst.dagar Ekki má nota dýralyfið á júgur mjólkandi dýra ef mjólkinn er ætluð til manneidis.	Já	
CYTOPOINT	Lokivetmabum INN	Stungulyf, lausn	10 mg	QD11AH91	Á ekki við.	Nei	
CYTOPOINT	Lokivetmabum INN	Stungulyf, lausn	20 mg	QD11AH91	Á ekki við.	Nei	
CYTOPOINT	Lokivetmabum INN	Stungulyf, lausn	30 mg	QD11AH91	Á ekki við.	Nei	
CYTOPOINT	Lokivetmabum INN	Stungulyf, lausn	40 mg	QD11AH91	Á ekki við.	Nei	
Danilon equidos	Suxibuzonum INN	Kyrni	1,5 g	QM01AA90	Ekki má nota lyfið handa dýrum sem ætluð eru til manneidis. Hestum sem meðhöndlaðir hafa verið með dýralyfinu má aldrei slátra til manneidis. Koma skal fram yfirlýsing um að hesturinn sé ekki ætlaður til manneidis, samkvæmt landslögum um hestavegabréf.	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Dany's BienenWohl	Oxalic acid dihydrate		39,4 mg/ml	QP53AG03		Nei	
Deltanil	Deltamethrin	Áhella, lausn	10 mg/ml	QP53AC11	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 17 sólarhringar. Mjólk: núll klukkustundir. Sauðfé: Kjöt og innmatur: 35 sólarhringar. Mjólk: núll klukkustundir.	Nei	
Demyrin vet.	Ciclosporinum INN	Augnsmyrslí	2 mg/g	QS01XA18		Nei	
Depomycine, vet.	Benzylpenicillinprocainum, Dihydro streptomycinum INN súlfat	Stungulyf, dreifa		QJ01RA01	Kjöt og innmatur: 60 sólarhringar eftir síðustu lyfjagjöf. Kúamjólk: 3 sólarhringar eftir síðustu lyfjagjöf. Dýralyfið má ekki gefa hrossum séu sláturafurðir nýttar til manneidis. Dýralyfið má ekki gefa mjólkandi ám sé mjólkinn nýtt til manneidis	Já	
Dermanolon vet.	Triamcinolonum INN acetóníð, Acidum salicylicum	Húðúði, lausn	1,77 mg/ml + 17,7 mg ml	QD07XB02	Á ekki við	Já	
Detonervin vet. 10 mg/ml stungulyf, lausn fyrir hesta og nautgripi.	Detomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn		QN05CM90	Hestar, nautgripir: Kjöt og innmatur: 2 dagar Mjólk: 12 klukkustundir	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Dexacortone vet	Dexamethasonum INN	Tuggutafla	0,5 mg	QH02AB02		Nei	
Dexacortone vet	Dexamethasonum INN	Tuggutafla	2 mg	QH02AB02		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Dexaject	Dexamethasonum INN natríumfosfat	Stungulyf, lausn	2 mg/ml	QH02AB02	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 8 dagar. Mjólk: 72 klst. Svín: Kjöt og innmatur: 2 dagar. Hestar: Kjöt og innmatur: 8 dagar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Dexdomitor	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,1 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Dexdomitor	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,5 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Dilaterol vet.	Clenbuterol-hydrochloride	Saft	25 míkróg/ml	QR03CC13	Kjöt og innmatur: 28 dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
Dolovet vet	Ketoprofenum INN	Duft til inntöku	160 mg/ g	QM01AE03	Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur Mjólk: Enginn	Já	
Domosedan Vet.	Detomidinum INN hýdróklóríð	Munnholshlaup	7,6 mg/ml	QN05CM90	Kjöt og innmatur: Núll dagar Mjólk: Núll klst.	Nei	
Domosedan, vet.	Detomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN05CM90	Kjöt og innmatur: Núll dagar. Mjólk: Núll dagar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Dorbene Vet	Medetomidinum INN	Stungulyf, lausn	1 mg/ml	QN05CM91	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Dormaquin vet	Midazolamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QN05CD08	Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa hrossum sem nýtt eru til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Doxybactin vet	DOXYCYCLINE HYCLATE	Tafla	200 mg	QJ01AA02		Nei	
Doxybactin vet	DOXYCYCLINE HYCLATE	Tafla	400 mg	QJ01AA02		Nei	
Doxybactin vet	DOXYCYCLINE HYCLATE	Tafla	50 mg	QJ01AA02		Nei	
Draxxin	Tulathromycinum INN	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QJ01FA94	Nautgripir (kjöt og innmatur): 22 sólarhringar. Svín (kjöt og innmatur): 13 sólarhringar. Sauðfé (kjöt og innmatur): 16 sólarhringar. Dýralyfið má ekki gefa mjólkandi dýrum sé mjólkin nýtt til manneldis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis	Nei	
Draxxin	Tulathromycinum INN	Stungulyf, lausn	25 mg/ml	QJ01FA94	Svín (kjöt og innmatur): 13 sólarhringar.	Nei	
Droncit, vet.	Praziquantelum INN	Hlaup til inntöku	9 %	QP52AA01	Sláturafurðir: Núll dagar. Mjólk: Ekki má nota lyfið handa hryssum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Nei	
Drontal, vet.	Pyrantelum INN embónat,Praziquantelum INN	Filmuhúðuð tafla		QP52AA51	Á ekki við.	Já	
Drontaste	Febantelum INN,Pyrantelum INN embónat,Praziquantelum INN	Tafla	150/144/50 mg	QP52AC55	Á ekki við	Já	
Drontaste	Febantelum INN,Pyrantelum INN embónat,Praziquantelum INN	Tafla	525/504/175 mg	QP52AA51		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Easotic	Hydrocortisonum INN aceponat, Miconazolum INN níturat, Gentamicinum INN súlfat	Eyrnadropar, dreifa		QS02CA03	Á ekki við.	Já	
Econor	Valnemulinum INN hýdróklóríð	Duft til inntöku	10 %	QJ01XQ02	1 sólarhringur	Nei	
Econor	Valnemulinum INN hýdróklóríð	Forblanda fyrir lyfjablandað fóður	10 %	QJ01XQ02	Svín: Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur. Kanínur: Kjöt og innmatur: Núll sólarhringar.	Nei	
Econor	Valnemulinum INN hýdróklóríð	Forblanda fyrir lyfjablandað fóður	50 %	QJ01XQ02	1 sólarhringur	Nei	
ECOPORC SHIGA	Genetically modified STx2e antigen	Stungulyf, dreifa		QI09AB02	0 dagar	Nei	
Eficur vet.	Ceftiofurum INN hýdróklóríð	Stungulyf, dreifa	50 mg/ml	QJ01DD90	Svín: Kjöt og innmatur: 5 dagar Nautgripir: Kjöt og innmatur: 8 dagar Mjólk: Núll dagar	Já	
Emdocam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Engemycin, vet.	Oxytetracyclinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QJ01AA06	Mjólk: 4 sólarhringar. Sláturafurðir: í Já æð 6 sólarhringar. Í vöðva-30 sólarhringar	Já	
Enrotron Flavour	Enrofloxacinum INN	Tafla	150 mg	QJ01MA90	Á ekki við.	Já	
Enrotron Flavour	Enrofloxacinum INN	Tafla	50 mg	QJ01MA90	Á ekki við.	Já	
Enterisol lleitis vet.	Lawsonia intracellularis	Frostþurrkað mixtúrduft og leysir, dreifa		QI09AE04	Núll dagar.	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Equibactin vet.	Trimethoprimum INN,Sulfadiazinum INN	Pasta til inntöku		QJ01EW10	Kjöt og innmatur: 14 sólarhringar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa hryssum sem gefa af sér mjólk til manneidis.	Já	
Equilis Prequenza	A/equine-2/ South Africa/4/03,A/equine -2/ Newmarket /1/93/50,A/equine -2/ Newmarket /2/93/50	Stungulyf, dreifa		QI05AA01	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Equilis Prequenza Te.	A/equine-2/ South Africa/4/03,A/equine -2/ Newmarket /1/93/50,A/equine -2/ Newmarket /2/93/50,Tetanus toxoid	Stungulyf, dreifa		QI05AL01	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Equilis StrepE	Streptococcus equi strain TW928	Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI05AE	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Equilis Te	Tetanus toxoid	Stungulyf, dreifa		QI05AB03	Núll dagar	Nei	
Equilis West Nile	Inactivated chimeric Flavivirus	Stungulyf, dreifa		QI05AA10	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Equimax Tabs Vet	Ivermectinum INN,Praziquantelum INN	Tuggutafla	150 mg/20 mg	QP54AA51	Kjöt og innmatur: 35 dagar. Lyfið má ekki gefa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneidis.	Nei	
Equioxx	Firocoxibum INN	Pasta til inntöku	8,2 mg/g	QM01AH90	Kjöt og innmatur: 26 dagar. Má ekki nota handa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneidis.	Nei	
Equioxx	Firocoxibum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AH90	Kjöt og innmatur: 26 sólarhringar. Má ekki nota handa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneidis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Equioxx	Firocoxibum INN	Tuggutafla	57 mg	QM01AH90	Kjöt og innmatur: 26 sólarhringar. Má ekki nota handa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneidis.	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Equip WNV	West Nile Virus inactivated	Stungulyf, fleyti		QI05AA10	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Equiparin	Heparinum natricum INN,Hydroxyethylis salicylas,Levomentholum INN	Hlaup		QC05BA53	Kjöt og innmatur: 0 dagar Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa merum sé mjólkinn nýtt til mannelldis.	Nei	
Equiparin	Heparinum natricum INN,Hydroxyethylis salicylas,Levomentholum INN	Hlaup		QC05BA53	Kjöt og innmatur: 0 dagar Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa merum sé mjólkinn nýtt til mannelldis.	Nei	
EquiShield EHV	equine herpesvirus 1, inactivated	Stungulyf, fleyti	min. 2.1 log ₁₀ Virus neutralization index	QI05AA05		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Equisolon	Prednisolonum INN	Duft til inntöku	100 mg	QH02AB06	Kjöt og innmatur: 10 dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til mannelldis.	Nei	
Equisolon	Prednisolonum INN	Duft til inntöku	300 mg	QH02AB06	Kjöt og innmatur: 10 dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til mannelldis.	Nei	
Equisolon	Prednisolonum INN	Duft til inntöku	33,3 mg/g	QH02AB06	Kjöt og innmatur: 10 dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til mannelldis.	Nei	
Equisolon	Prednisolonum INN	Duft til inntöku	600 mg	QH02AB06	Kjöt og innmatur: 10 dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til mannelldis.	Nei	
Eqvalan Duo Vet.	Ivermectinum INN,Praziquantelum INN	Pasta til inntöku		QP54AA51	Kjöt: 30 sólarhringar.Ekki má gefa lyfið hryssum sem gefa af sér mjólk til mannelldis.	Já	
Eqvalan vet.	Ivermectinum INN	Pasta til inntöku	1,87 %	QP54AA01	Kjöt og innmatur: 30 sólarhringar	Já	
ERADIA	Metronidazolium INN	Mixtúra, dreifa	125 mg/ml	QP51AA01		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Eraquell vet.	Ivermectinum INN	Tuggutafla	20 mg	QP54AA01	Kjöt og innmatur: 35 dagar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
Eravac	Rabbit haemorrhagic disease type 2 virus (RHDV2), inactivated	Stungulyf, fleyti		QI08AA01	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
ERYSENG	Erysipelothrix rhusiopathiae, stofn R32E11 (óvirkuð)	Stungulyf, dreifa		QI09AB03	Núll dagar.	Nei	
ERYSENG PARVO	Erysipelothrix rhusiopathiae, stofn R32E11 (óvirkuð), Porcine Parvovirus Vaccine (Inactivated)	Stungulyf, dreifa		QI09AL01	Núll dagar.	Já	
Estrumat vet.	Cloprostenolum INN natríum	Stungulyf, lausn	0,25 mg/ml	QG02AD90	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur. Mjólk: 1 mjaltir (minnst 7 klukkustundir). Svín og hestar: Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Eurican Herpes 205	Canine herpesvirus (F205 strain) antigens	Stungulyf, fleyti		QI07AA06	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Euthasol vet.	Pentobarbitalum INN natríum	Stungulyf, lausn	400 mg/ml	QN51AA01	Gera skal viðeigandi ráðstafanir til þess að hræ dýra sem eru aflífuð með dýralyfinu og afurðir þessara dýra berist ekki í fæðukeðjuna og verði ekki notuð til manneldis né sem dýrafóður.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Evalon	Eimeria acervulina, strain 003, Eimeria maxima, strain 013, Eimeria necatrix, strain 033, Eimeria brunetti, strain 034, Eimeria tenella, strain 004	Dreifa og leysir til inntökuúðunar		QI01AN01	Núll dagar.	Já	
EVANT	eimeria acervulina, live, eimeria maxima, live, eimeria mitis, live, eimeria praecox, live, eimeria tenella, live	Dreifa og leysir til inntökuúðunar		QI01AN01		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Exagon vet.	Pentobarbitalum INN natríum	Stungulyf, lausn	400 mg/ml	QN51AA01	Á ekki við. Gera á viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að hræ dýra sem gefið hefur verið þetta lyf og afurðir af þeim dýrum berist ekki í fæðukeðjuna og séu ekki notuð til manneldis eða dýrafóðurs.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Exitel Plus	Praziquantelum INN, Pyrantelum INN embónat, Febantelum INN	Tafla	50/144/150 mg	QP52AA51	Á ekki við	Nei	
Exzolt	Fluralanerum INN	Lausn til notkunar í drykkjarvatn	10 mg/ml	QP53BE02	Kjöt og innmatur: 14 dagar. Egg: Núll dagar.	Nei	
Ferglep vet.	Iron (as gleptoferron comples)	Stungulyf, lausn	200 mg/ml	QB03AC	Kjöt og innmatur: Núll dagar.	Nei	
Fevaxyn Pentofel	Feline Viral Rhinotracheitis, Feline Panleucopenia, Feline Leukemia Virus, Feline Chlamydia Psittaci, Feline Calcivirus	Stungulyf, lausn		QI06AL01	Á ekki við	Nei	
Finadyne vet.	Flunixinum INN meglúmínsalt	Stungulyf, lausn	50 mg/ml	QM01AG90	Sláturfurðir: Nautgripir - 4 sólarhringar. Hross-3 sólarhringar. Svín- 28 sólarhringar. Mjólk-1 sólarhringur.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Finilac	Cabergolinum INN	Mixtúra, lausn	50 míkróg/ml	QG02CB03	Á ekki við.	Já	
Finquel vet.	Tricaine mesylate	Duft fyrir baðlausn	1000 mg/g	QN01AX93	Afurðir: 25 gráðudagar. Ef þorski er slátrað innan 21 sólarhrings skal lifrinni fargað.	Já	
FLORSELECT VET.	Florfenicolum INN	Stungulyf, lausn	300 mg/ml	QJ01BA90	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 30 dagar. Má ekki nota handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Svín: Kjöt og innmatur: 18 dagar.	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Flukiver Combi vet.	Closetelum INN natríum,Mebendazolium INN	Mixtúra, lausn	50/75 mg/ml	QP52AC59	Biðtími: Kjöt og innmatur: 65 dagar. Mjólk: Ekki má nota lyfið handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til mannelis, þetta gildir einnig á þurra tímabilinu. Ekki má nota lyfið innan eins árs þar til ær verða lambfullar í fyrsta sinn, ef nýta á mjólkina til mannelis.	Nei	
Flunixin	Flunixinum INN meglúmínsalt	Stungulyf, lausn	50 mg/ml	QM01AG90	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 7 dagar Mjólk: 36 klukkustundir Hestar: Kjöt og innmatur: 7 dagar Svín: Kjöt og innmatur: 22 dagar Ekki má nota dýralyfið hjá hryssum sem nýttar eru til mjólkurframleiðslu til mannelis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Fortekor Plus	Pimobendanum INN,Benazeprilum INN INN hýdróklóríð	Tafla	1,25 mg/2,5 mg	QC09BX90	Á ekki við.	Nei	
Fortekor Plus	Pimobendanum INN,Benazeprilum INN INN hýdróklóríð	Tafla	5 mg/10 mg	QC09BX90	Á ekki við.	Nei	
Fungitraxx	Itraconazolium INN	Mixtúra, lausn	10 mg/ml	QJ02AC02	Á ekki við	Nei	
Furosoral vet.	Furosemidum INN	Tafla	10 mg	QC03CA01	Á ekki við.	Nei	
Furosoral vet.	Furosemidum INN	Tafla	40 mg	QC03CA01	Á ekki við.	Nei	
Gabbrovet	PAROMOMYCIN SULFATE	Lausn til notkunar í drykkjarvatn/mjólk	140 mg/ml	QA07AA06		Nei	
GALLIPRANT	Grapiprantum INN	Tafla	100 mg	QM01AX		Nei	
GALLIPRANT	Grapiprantum INN	Tafla	20 mg	QM01AX		Nei	
GALLIPRANT	Grapiprantum INN	Tafla	60 mg	QM01AX		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Geepenil Vet.	Benzylpenicillinum INN natrium	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	24 g	QJ01CE01	Kjöt og innmatur: Nautgripir, svín og hestar 10 dagar. Mjólk: 2 dagar.	Já	
Genestran Vet	Cloprostenolum INN natrium	Stungulyf, lausn	75 míkróg/ml	QG02AD90	Nautgripir og hestar Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur Mjólk: 0 klukkutímar Svín Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Genta-Equine	Gentamicinum INN súlfat	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QJ01GB03	Notið ekki handa hrossum sem sem gefa af sér kjöt og mjólk til manneldis	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Gonavet Veyx	Gonadorelin[6-D-Phe]	Stungulyf, lausn	50 míkróg/ml	QH01CA01	Nautgripir, svín, hestar Kjöt og innmatur: Núll dagar Nautgripir, hestar Mjólk: Núll klst.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
GUDAIR	Mycobacterium Paratuberculosis, inactivated strain 316 F	Stungulyf, fleyti		QI04AB09	Núll dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Halagon	Halofuginonum INN laktat	Mixtúra, lausn	0,5 mg/ml	QP51AX08	Kjöt og innmatur: 13 sólarhringar	Nei	
Halocur	Halofuginonum INN laktat	Mixtúra, lausn	0,5 mg/ml	QP51AX09	Kjöt og innmatur: 13 sólarhringar	Nei	
Hiprabovis IBR Marker Live	Live gE tk IBRV strain Ceddel Live	Frostpurrað stungulyf, dreifa		QI02AD01	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Histodine	CHLORPHENAMINE MALEATE	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QR06AB04	Biðtími Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur Mjólk: 12 klukkustundir	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Ibraxion	gE deleted inactivated IBR virus	Stungulyf, fleyti		QI02AA03	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Improvac	GnRF hliðstæða samtengd próteíni	Stungulyf, lausn		QG03XA91	Núll dagar	Já	
Imrestor	Pegbovigrastimum INN	Stungulyf, lausn	15 mg	QL03AA90	Kjöt og innmatur: Núll dagar. Mjólk: Núll dagar.	Nei	
Incurin	Estriolum INN	Tafla	1 mg	QG03CA04	Á ekki við	Nei	
Inflacam	Meloxicamum INN	Kyrni	330 mg	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
Inflacam	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Inflacam	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Inflacam	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
Inflacam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Inflacam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Inflacam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Inflacam	Meloxicamum INN	Tuggutafla	1 mg	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Inflacam	Meloxicamum INN	Tuggutafla	2,5 mg	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Ingelvac CircoFLEX	Porcine Circovirus Type 2 Orf-2 protein	Stungulyf, dreifa		QI09AA07	Núll dagar	Já	
Ingelvac MycoFLEX	Mycoplasma hyopneumoniae óvirk	Stungulyf, dreifa		QI09AB13	Núll dagar.	Já	
Ingelvac PCV FLEX	Porcine Circovirus Type 2 Orf-2 protein	Stungulyf, dreifa		QI09AA07	Núll dagar	Nei	
Innovax-ILT		Dreifa og leysir fyrir stungulyf, dreifa		QI01AD03	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Innovax-ND-IBD		Dreifa og leysir fyrir stungulyf, dreifa		QI01AD	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Isemid	Torasemidum INN	Tuggutafla	1 mg	QC03CA04		Nei	
Isemid	Torasemidum INN	Tuggutafla	2 mg	QC03CA04		Nei	
Isemid	Torasemidum INN	Tuggutafla	4 mg	QC03CA04		Nei	
Ivomec vet.	Ivermectinum INN	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QP54AA01	Nautgripir: 49 dagar. Svín, sauðfé og geitur: 45 dagar. Mjólk: 60 dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Kefavet vet	Cefalexinum INN mónóhýdrat	Filmuhúðuð tafla	250 mg	QJ01DB01	Á ekki við	Nei	
Kefavet vet	Cefalexinum INN mónóhýdrat	Filmuhúðuð tafla	500 mg	QJ01DB01	Á ekki við	Nei	
Kelactin vet.	Cabergolinum INN	Mixtúra, lausn	50 mikróg/ml	QG02CB03	Á ekki við	Nei	
Ketador vet.	Ketaminum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QN01AX03	Hestar og nautgripir: Kjöt og innmatur: Núll dagar. Mjólk: Núll klukkustundir. Svín: Kjöt og innmatur: Núll dagar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Ketodine vet.	Ketoprofenum INN	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QM01AE03	Nautgripir Kjöt og innmatur: Eftir gjöf í bláæð - 1 sólarhringur. Eftir gjöf í vöðva - 4 sólarhringar. Mjólk: Núll klst. Svín Kjöt og innmatur: 4 sólarhringar. Hestar Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur. Mjólk: Lyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneidis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Kexxtone	Monensinum INN	Vambarinnlegg með samfellda losun	32,4 g	QA16QA06	Kjöt og innmatur: núll dagar Mjólk: núll dagar	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
KRIPTAZEN	Halofuginonum INN laktat	Mixtúra, lausn	0,5 mg/ml	QP51AX08		Nei	
Lambivac, vet.	Clostridium perfringens Type-C Beta Toxoid, Clostridium perfringens Type-D Epsilon Toxoid, Clostridium perfringens Type-B Beta Toxoid, Clostridium tetani toxoid	Stungulyf, dreifa		QI04AB01	Núll dagar	Já	
Laxatract	Lactulosum INN	Saft	667 mg/ml	QA06AD11		Nei	
Letifend	Leishmania infantum MON-1 (raðbrigða prótein Q)	Frostpurkað stungulyf og leysir, lausn		QI07A	Á ekki við.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi. Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Leucofeligen FeLV/RCP	Calicivirus F9 strain,Rhinotracheitis virus F2 strain,Panleucopenia virus LR 72 strain,Recombinant p45 FeL V-envelope antigen,Sodium Chloride	Frostþurrkað stungulyf, dreifa		QI06AH07	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Leucogen	Recombinant p45 FeL V-envelope antigen	Stungulyf, dreifa	102 míkróg	QI06AA01	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D). Innflutningur og sala óheimil á Íslandi
Lidokel Adrenalin vet. Kela	Lidocainum INN hýdróklóríð,Adrenalinum tartras	Stungulyf, lausn		QN01BB52	Hross: Núll dagar Sé lyfið notað handa dýrum til manneldis samkvæmt „þrepaákvæðunum“ í tilskipun 2001/82/EBE er í 5. gr. fyrirmæla um notkun lyfja fyrir dýr sem staðfest voru 16.01.07, gerð sérstök undantekning varðandi biðtíma fyrir afurðanýtingu eftir notkun lídókaíns; Núll dagar fyrir mjólk og 1 dagur fyrir kjöt.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Lidor vet.	Lidocainum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QN01BB02	Hestar: Kjöt og innmatur: 3 dagar. Mjólk: 3 dagar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Linspec	Lincomycinum INN hýdróklóríð,Spectinomycinum INN súlfat	Stungulyf, lausn	50 + 100 mg/ml	QJ01FF52	Kjöt og innmatur Svín: 14 dagar Mjólkurkálfar: 21 dagar	Nei	
Locatim	Anti E.coli F5 (K99) Specific IgGs	Mixtúra, lausn		QI02AT01	Núll dagar	Nei	
Loxicom	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Loxicom	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Loxicom	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Loxicom	Meloxicamum INN	Pasta til inntöku	50 mg/g	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Nei	
Loxicom	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Loxicom	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Loxicom	Meloxicamum INN	Tuggutafla	1 mg	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Loxicom	Meloxicamum INN	Tuggutafla	2,5 mg	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Malaseb vet.	Chlorhexidinum INN díglúkónat,Miconazolum INN nítat	Hársápa	2 % w/v	QD08AC52	Á ekki við	Já	
Mamyzin vet.	Penethamate Hydroiodide BAN	Stungulyfsstofn og leysir, dreifa	10.000.000 a.e.	QJ01CE90	Sláturafurðir: 6 sólarhringar. Mjólk: 96 klukkustundir.	Já	
Masivet	Masitinibum INN mesýlat	Filmuhúðuð tafla	150 mg	QL01XE22	Á ekki við.	Nei	
Masivet	Masitinibum INN mesýlat	Filmuhúðuð tafla	50 mg	QL01XE22	Á ekki við.	Nei	
Melosus	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Melosus	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Melovem	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar Mjólk: 5 sólarhringar Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Melovem	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	30 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar Mjólk: 5 sólarhringar Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Melovem	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Meloxidolor	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir = kjöt og innmatur: 15 sólarhringar; Mjólk: 5 sólarhringar Svín = Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýrallyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Meloxidolor	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir = kjöt og innmatur: 15 sólarhringar Svín = Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Meloxidyl	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Meloxidyl	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Meloxidyl	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýrallyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Meloxidyl	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Meloxoral	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Já	
Meloxoral	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Menbutil	Menbutone	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QA05AX90	Kjöt og innmatur: Núll sólarhringar Mjólk: Núll sólarhringar	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Mepidor vet.	Mepivacainum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QN01BB03	Þetta dýrallyf er ekki viðurkennt til notkunar handa hestum sem gefa af sér kjöt eða mjólk til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metacam handa hestum	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar.	Já	
Metacam handa hundum	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0.5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við.	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Metacam handa hundum	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við.	Já	
Metacam handa hundum	Meloxicamum INN	Tuggutafla	1,0 mg	QM01AC06	Á ekki við.	Nei	
Metacam handa hundum	Meloxicamum INN	Tuggutafla	2.5 mg	QM01AC06	Á ekki við.	Nei	
Metacam handa hundum og köttum	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metacam handa köttum	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Já	
Metacam handa köttum	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	2 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metacam handa nautgripum og hestum	Meloxicam	Stungulyf, lausn	40 mg/ml	QM01AC06	Biðtími: Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar; mjólk: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metacam handa nautgripum og svínum	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Metacam handa nautgripum, svínum og hestum	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneidis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metacam handa svínum	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Nei	
Metomotyl	Metoclopramidum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	2,5 mg/ml	QA03FA01	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metomotyl	Metoclopramidum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QA03FA01	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Metrobactin vet	Metronidazolium INN	Tafla	250 mg	QP51AA01	Á ekki við.	Já	
Metrobactin vet	Metronidazolium INN	Tafla	500 mg	QP51AA01	Á ekki við.	Nei	
MiPet Easecto	Sarolanerum INN	Tuggutafla	10 mg	QP53BE03		Nei	
MiPet Easecto	Sarolanerum INN	Tuggutafla	120 mg	QP53BE03		Nei	
MiPet Easecto	Sarolanerum INN	Tuggutafla	20 mg	QP53BE03		Nei	
MiPet Easecto	Sarolanerum INN	Tuggutafla	40 mg	QP53BE03		Nei	
MiPet Easecto	Sarolanerum INN	Tuggutafla	5 mg	QP53BE03		Nei	
MiPet Easecto	Sarolanerum INN	Tuggutafla	80 mg	QP53BE03		Nei	
Morphasol vet	Butorphanolum INN tartrat	Stungulyf, lausn	4 mg/ml	QN02AF01	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
MS-H Vaccine	Mycoplasma synoviae Strain MS-H living	Augndropar, dreifa		QI01AE	Núll dagar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D). Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Myodine vet	Nandrolone laurate	Stungulyf, lausn	25 mg/ml	QA14AB01		Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Narcostart	Medetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	1 mg/ml	QN05CM91	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Narcostop	Atipamezolum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QV03AB90	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Naxcel	Ceftiofurum INN	Stungulyf, dreifa	100 mg/ml	QJ01DD90	Kjöt og innmatur: 71 sólarhringur	Nei	
Naxcel	Ceftiofurum INN	Stungulyf, dreifa	200 mg/ml	QJ01DD90	Kjöt og innmatur: 9 dagar. Mjólk: Núll dagar. Það skiptir öllu að NAXCEL sé aðeins gefið undir húð við rót eyrans í vef sem ekki er nýttur til manneldis eins og lýst er í kafla 4.9 svo það samræmist biðtíma fyrir kjötnýtingu.	Nei	
Nematel Vet.	Pyrantelum INN embónat	Pasta til inntöku	439 mg/g	QP52AF02	Kjöt og innmatur: Núll dagar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hryssum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	
Neocolipor	Adhesins F4 (F4ab / F4ac / F4ad), Adhesin F5, Adhesin F6, Adhesin F41	Stungulyf, dreifa	2 ml	QI09AB02	Núll dagar	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Nerfasin vet.	Xylazinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QN05CM92	Nautgripir: Kjöt og innmatur: einn dagur Mjólk: núll klukkustundir Hestar: Kjöt og innmatur: einn dagur Mjólk: núll klukkustundir	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Nerfasin vet.	Xylazinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QN05CM92	Nautgripir: Kjöt og innmatur: einn dagur Mjólk: núll klukkustundir Hestar: Kjöt og innmatur: einn dagur Mjólk: núll klukkustundir	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
NexGard	Afoxolanerum INN	Tuggutafla	11 mg	QP53BE01	Á ekki við	Nei	
NexGard	Afoxolanerum INN	Tuggutafla	136 mg	QP53BE01	Á ekki við	Nei	
NexGard	Afoxolanerum INN	Tuggutafla	28 mg	QP53BE01	Á ekki við	Nei	
NexGard	Afoxolanerum INN	Tuggutafla	68 mg	QP53BE01	Á ekki við	Nei	
Nexgard Spectra	Afoxolanerum INN,milbemycin oxime	Tuggutafla	150 mg/30 mg	QP54AB51	Á ekki við.	Já	
Nexgard Spectra	Afoxolanerum INN,milbemycin oxime	Tuggutafla	19 mg/4 mg	QP54AB51	Á ekki við.	Já	
Nexgard Spectra	Afoxolanerum INN,milbemycin oxime	Tuggutafla	38 mg/8 mg	QP54AB51	Á ekki við.	Já	
Nexgard Spectra	Afoxolanerum INN,milbemycin oxime	Tuggutafla	75 mg/15 mg	QP54AB51	Á ekki við.	Já	
Nexgard Spectra	Afoxolanerum INN,milbemycin oxime	Tuggutafla	9 mg/2 mg	QP54AB51	Á ekki við.	Já	
Nobilis IB 4-91	Live Attenuated Infectious Bronchitis Virus Strain 4-91	Stungulyf, lausn		QI01AD07	Núll dagar	Nei	
Nobilis IB Primo QX	Live IBV strain D388			QI01AD07	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Nobilis Influenza H5N2	Avian influenza virus antigen (whole, inactivated) of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)	Stungulyf, fleyti		QI01AA23	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Nobilis OR inac	Whole Cells Strain B3263/91 Serotype A	Stungulyf, fleyti		QI01AB07	Núll dagar	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Nobivac Bb	Bordetella Bronchiseptica	Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI06AE02	Á ekki við	Nei	
Nobivac L4	Leptospira Canicola, Leptospira Icterohaemorrhagiae, Leptospira Australis, Leptospira Grippotyphosa	Stungulyf, dreifa		QI07AB01	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Nobivac LeuFel	Purified P45 FELC-Envelope Antigen	Stungulyf, dreifa		QI06AA01		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Nobivac Myxo-RHD	Live myxoma vectored RHD virus strain 009	Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI08AD	Núll dagur	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Noromectin	Ivermectinum INN	Áhella, lausn	0,5 % w/v	QP54AA01	Kjöt og innmatur: 28 dagar	Já	Dýralyfið má ekki gefa mjólkandi kúm sé mjólkinn nýtt til mannelis. Ekki á að nota dýralyfið hjá mjólkurkúm sem ekki eru mjólkandi, þ.m.t. kálffullar kvígur, innan 60 daga fyrir burð.
Noromectin	Ivermectinum INN	Pasta til inntöku	1,87 %	QP54AA01	Vefir til mannelis: 34 dagar	Já	Ekki má slátra dýrum til mannelis meðan á meðferð stendur. Ekki má meðhöndla hesta innan 34 daga áður en þeim er slátrað til mannelis. Ekki má nota lyfið hjá mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til mannelis.

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Noromectin	Ivermectinum INN	Stungulyf, lausn	1 % w/v	QP54AA01	Nautgripir Kjöt og innmatur: 42 dagar Svín Kjöt og innmatur: 35 dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Noromectin Drench	Ivermectinum INN	Mixtúra, lausn	0,8 mg/ml	QP54AA01	Kjöt og innmatur: 10 dagar Mjólk: Dýralyfið má ekki gefa mjólkandi ám sé mjólkinn nýtt til manneldis. Ekki á að nota dýralyfið hjá mjólkurám sem ekki eru mjólkandi, innan 60 daga fyrir burð.	Já	
Novaquin	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa hrossum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Já	
Novem	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Novem	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	40 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Novem	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Oncept IL-2	Feline interleukin-2 recombinant canarypox virus (vCP1338)	Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa		QL03AX	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Onsior	Robenacoxibum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AH91	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Onsior	Robenacoxibum INN	Tafla	10 mg	QM01AH91	Á ekki við.	Nei	
Onsior	Robenacoxibum INN	Tafla	20 mg	QM01AH91	Á ekki við.	Nei	
Onsior	Robenacoxibum INN	Tafla	40 mg	QM01AH91	Á ekki við.	Nei	
Onsior	Robenacoxibum INN	Tafla	5 mg	QM01AH91	Á ekki við.	Nei	
Onsior	Robenacoxibum INN	Tafla	6 mg	QM01AH91	Á ekki við.	Nei	
Ophtaclin vet	Chlortetracyclinum INN	hýdróklóríð Augnsmyrslí	10 mg/g	QS01AA02	Biðtími: Kjöt og innmatur: 1 sólarhringur Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa hestum sem gefa af sér mjólk til manneðis.	Nei	
Oramec Drench vet.	Ivermectinum INN	Mixtúra, lausn	0,8 mg/ml	QP54AA01	Sláturafurðir Sauðfé: 6 dagar. Geitur: 8 dagar. Ekki má nota lyfið handa ám og huðnum sem gefa af sér mjólk til manneðis.	Já	
Osphos	Dinatrii clodronas INN	Stungulyf, lausn	51 mg/ml	QM05BA02	Kjöt og innmatur: Núll dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneðis	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
OSURNIA	Florfenicolum INN, Terbinafinum INN, Betamethasonum INN acetat	Eyrnahlaup		QS02CA90	Á ekki við	Nei	
Otimectin vet.	Ivermectinum INN	Eyrnahlaup	1 mg/g	QS02QA03	Á ekki við	Já	
Oxybee	Oxalic acid dihydrate	Býbúsördreifa	35 g	QP53AG03		Nei	
Oxyglobin	Hemoglobin glutamer 200 (bovine)	Innrennslislyf, lausn		QB03XA	Á ekki við	Nei	Afgreiðslutilhögun verður ákveðin ef til markaðssetningar kemur.

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Oxytobel	Oxytocinum INN	Stungulyf, lausn	10 a.e./ml	QH01BB02	Kjöt, innmatur og mjólk: núll dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Palladia	Toceranibum INN fosfat	Filmuhúðuð tafla	10 mg	QL01XE91	Á ekki við	Nei	
Palladia	Toceranibum INN fosfat	Filmuhúðuð tafla	15 mg	QL01XE91	Á ekki við	Nei	
Palladia	Toceranibum INN fosfat	Filmuhúðuð tafla	50 mg	QL01XE91	Á ekki við	Nei	
Panacur AquaSol	Fenbendazolum INN	Dreifa til notkunar í drykkjarvatn	200 mg/ml	QP52AC13	Svín: Kjöt og innmatur: 4 sólarhringar. Hænsni: Kjöt og innmatur: 6 sólarhringar. Egg: Núll sólarhringar.	Nei	
Parvodus	Muscovy anda parvoveirustofn (lifandi, veiklaður)	Stungulyfsþykki og leysir, dreifa		QI01BD03	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Penethaone vet	Penethamate Hydriodide	Stungulyfsstofn og leysir, dreifa	236,3 mg/ml	QJ01CE90	Kjöt og innmatur: 4 dagar Mjólk: 60 klst	Já	
Penovet vet.	Benzylpenicillinprocainum	Stungulyf, dreifa		QJ01CE09	Kjöt og innmatur: Nautgripir, sauðfé, geitur, hestar: 15 sólarhringar. Svín: 5 sólarhringar. Mjólk: 3 sólarhringar.	Já	
Perlutex vet.	Medroxyprogesteronum INN acetat	Tafla	5 mg	QG03DA02	Á ekki við	Já	
Permacyl	Penethamate Hydriodide	Stungulyfsstofn og leysir, dreifa	236,3 mg/ml	QJ01CE90	Kjöt og innmatur: 4 dagar. Mjólk: 60 klst.	Nei	
Pexion	Imepitoinum INN	Tafla	100 mg	QN03AX90	Á ekki við	Já	
Pexion	Imepitoinum INN	Tafla	400 mg	QN03AX90	Á ekki við	Já	
Phenoleptil	Phenobarbitalum INN	Tafla	100 mg	QN03AA02	Á ekki við	Já	
Phenoleptil	Phenobarbitalum INN	Tafla	12,5 mg	QN03AA02	Á ekki við	Nei	
Phenoleptil	Phenobarbitalum INN	Tafla	25 mg	QN03AA02	Á ekki við	Já	
Phenoleptil	Phenobarbitalum INN	Tafla	50 mg	QN03AA02	Á ekki við	Nei	
Pimobendan Boehringer Ingelheim Vetmedica	Pimobendanum INN	Tuggutafla	1,25 mg	QC01CE90	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Pimobendan Boehringer Ingelheim Vetmedica	Pimobendanum INN	Tuggutafla	10 mg	QC01CE90	Á ekki við	Nei	
Pimobendan Boehringer Ingelheim Vetmedica	Pimobendanum INN	Tuggutafla	2,5 mg	QC01CE90	Á ekki við	Nei	
Pimobendan Boehringer Ingelheim Vetmedica	Pimobendanum INN	Tuggutafla	5 mg	QC01CE90	Á ekki við	Nei	
Pirsue	Pirlimycinum INN hýdróklóríð	Spenalyf, lausn		QJ51FF90	Kjöt og innmatur: 23 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar.	Nei	
Porcilis AR-T DF	Protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin), Inactivated Bordetella bronchiseptica cells	Stungulyf, dreifa		QI09AB04	Núll dagar	Nei	
Porcilis ColiClos	E. coli F4ab, E. coli F4ac, E. coli F5, E. coli F6, E. coli LT, C. perfringens type C	Stungulyf, dreifa		QI09AB08	Núll dagar.	Nei	
Porcilis M Hyo ID ONCE	Inactivated whole cell concentrate of M hyopneumoniae strain 11	Stungulyf, fleyti		QI09AB13	Biðtími: Núll dagar	Nei	
Porcilis PCV	ORF2 subunit antigen in basal medium	Stungulyf, fleyti		QI09AA07	Núll dagar.	Nei	
Porcilis PCV ID	Porcine Circovirus Type 2 Orf-2 protein	Stungulyf, fleyti		QI09AA07	Núll dagar	Nei	
Porcilis PCV M Hyo	Porcine Circovirus Type 2 Orf-2 protein, M. hyopneumoniae inactivated	Stungulyf, fleyti		QI09AL	Núll dagar.	Nei	
Porcilis Pesti	CSFV-E2 antigen	Stungulyf, fleyti		QI09AA06	Núll dagar	Nei	
Porcilis Porcoli	E.-coli 5 concentrate, °LT Toxoid, °F4 (K88ab) antigen, °F4 (K88ac) antigen, °F5 (K99) antigen, °F6 (987 P) antigen	Stungulyf, fleyti		QI09AB02	Núll dagar	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Porcilis Porcoli Diluvac Forte	E Coli Concentrate,F4ab (K88ab) fimbrial adhesin,F4ac (K88ac) fimbrial adhesin,F5 (K99) fimbrial adhesin,F6 (987P) fimbrial adhesin,LT Toxoid	Stungulyf, dreifa		QI09AB02	Núll dagar	Nei	
Posatex	Orbifloxacinum INN,Mometasonum INN fúróat,Posaconazolum INN	Eyrnadropar, dreifa		QS02CA91	Á ekki við.	Nei	
Poulvac E. Coli	Live aroA gene deleted Escherichia coli,type 078, strain EC34195	Frostpurkað lyf, dreifa		QI01AE04	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Prac-tic	Pyriprole	Blettunarlausn	56,25 mg	QP53AX26	Á ekki við.	Nei	
Prascend	Pergolidum INN mesýlat	Tafla	1 mg	QN04BC02	Dýralyfið er ekki leyft til notkunar hjá hestum sem eru nýttir til manneldis. Leggja skal fram yfirlýsingu þess efnis að hesturinn verði ekki nýttur til manneldis samkvæmt gildandi reglugerð um hestavegabréf. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	
Prazitel	Praziquantelum INN,Pyrantelum INN embónat	Filmuhúðuð tafla		QP52AA01	Á ekki við.	Nei	
Prazitel Plus	Praziquantelum INN,Pyrantelum INN embónat,Febantelum INN	Tafla	50/144/150 mg	QP52AA51	Á ekki við.	Já	
Prazitel Plus XL	Praziquantelum INN,Pyrantelum INN embónat,Febantelum INN	Tafla	175 mg/504 mg/525 mg	QP52AA51	Á ekki við.	Nei	
Prednicortone vet.	Prednisolonum INN	Tafla	20 mg	QH02AB06	Á ekki við	Nei	
Prednicortone vet.	Prednisolonum INN	Tafla	5 mg	QH02AB06	Á ekki við	Nei	
Previcox	Firocoxibum INN	Tuggutafla	227 mg	QM01AH90	Á ekki við	Nei	
Previcox	Firocoxibum INN	Tuggutafla	57 mg	QM01AH90	Á ekki við	Nei	
Prevomax	Maropitantum INN citrat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QA04AD90		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Prid alpha	Progesteronum INN	Skeiðarinnlegg	1,55 g	QG03DA04	Kjöt og innmatur: Núll dagar Mjólk: Núll klukkustundir Meðan á meðferð stendur má afhenda kjöt, innmat og mjólk til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Prid delta	Progesteronum INN	Skeiðarinnlegg	1,55 g	QG03DA04	Kjöt og innmatur: núll dagar Mjólk: núll dagar	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Prilactone	Spironolactonum INN	Tafla	10 mg	QC03DA01	Á ekki við.	Nei	
Prilactone	Spironolactonum INN	Tafla	40 mg	QC03DA01	Á ekki við.	Nei	
Prilactone	Spironolactonum INN	Tafla	80 mg	QC03DA01	Á ekki við.	Nei	
Procamidor vet.	Procainum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QN01BA02	Nautgripir, sauðfé og hestar: Kjöt og innmatur: Núll dagar. Mjólk: Núll klukkustundir. Svín: Kjöt og innmatur: Núll dagar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Procopen vet	Benzylpenicillinprocainum	Spenalyf, dreifa	3 g	QJ51CE09	Kjöt og innmatur: 5 dagar Mjólk: 6 dagar	Já	
Procox	Emodepsidum INN,Toltrazurilum INN	Mixtúra, dreifa	0,9 + 18 mg/ml	QP52AX60	Á ekki við.	Nei	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Blettunarlausn		QP52AA51	Á ekki við.	Nei	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Blettunarlausn		QP52AA51	Á ekki við.	Já	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Blettunarlausn		QP52AA51	Á ekki við.	Já	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Blettunarlausn		QP52AA51	Á ekki við.	Já	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Tafla með breyttan losunarhraða	10/50 mg	QP52AA51	Á ekki við.	Nei	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Tafla með breyttan losunarhraða	3/15 mg	QP52AA51	Á ekki við.	Nei	
Profender	Emodepsidum INN,Praziquantelum INN	Tafla með breyttan losunarhraða	30/150 mg	QP52AA51	Á ekki við.	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Pronestestic vet	Procainum INN hýdróklóríð,Adrenalinum (Epinephrinum INN)	Stungulyf, lausn	40 mg/ml / 0,036 mg/ml	QN01BA52	Hestar, nautgripir, svín og sauðfé: Kjöt og innmatur: núll dagar Mjólk: núll klukkustundir Svín: Kjöt og innmatur: núll dagar	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Propodine	Propofolum INN	Stungulyf/innrennslis- lyf, fleyti		QN01AX10		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Proteq West Nile	vCP2017 virus	Stungulyf, dreifa		QI05AX	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
ProteqFlu	vCP2242 virus,vCP1533	Stungulyf, dreifa		QI05AD02	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
ProteqFlu-Te	vCP2242 virus,vCP1533,Clostridium tetani toxoid	Stungulyf, dreifa		QI05AI01	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
ProZinc	Insulinum humanum INN	Stungulyf, dreifa	40 a.e./ml	QA10AC01	Á ekki við	Nei	
Purevax FeLV	vCP 97 virus	Stungulyf, dreifa		QI06AH	Á ekki við	Nei	
Purevax Rabies	vCP65 virus	Stungulyf, dreifa		QI06AD08	Á ekki við	Nei	
Purevax RC	Attenuated Feline Viral Rhinothacheitis(FVH F2 Strain),Inactivated Feline Calcirovosis Antigens (FCV 431 and FCV G1 Strains	Frostþurrkað stungulyf, dreifa		QI06AH08	Á ekki við	Nei	
Purevax RCP	Attenuated Feline Viral Rhinothacheitis(FVH F2 Strain),Inactivated Feline Calcirovosis Antigens (FCV 431 and FCV G1 Strains,Attenuated Feline Panleucopenia Virus (PLI IV)	Frostþurrkað stungulyf, dreifa		QI06AH09	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Purevax RCP FeLV	Attenuated Feline Viral Rhinotracheitis(FVH F2 Strain),Inactivated Feline Calciviro-sis Antigens (FCV 431 and FCV G1 Strains,Attenuated Feline Chlamydiosis (905 Strain),FeL V Recombinant canarypox Virus (vCP97)	Frostpurrað stungulyf, dreifa		QI06AH	Á ekki við	Nei	
Purevax RCPCh	Attenuated Feline Viral Rhinotracheitis(FVH F2 Strain),Inactivated Feline Calciviro-sis Antigens (FCV 431 and FCV G1 Strains,Attenuated Feline Chlamydiosis (905 Strain),Attenuated Feline Panleucopenia Virus (PLI IV)	Frostpurrað stungulyf, dreifa		QI06AJ	Á ekki við	Nei	
Purevax RCPCh FeLV	Feline herpesvirus,Inactivated Feline Calciviro-sis Antigens (FCV 431 and FCV G1 Strains,Attenuated Feline Chlamydiosis (905 Strain),Attenuated Feline Panleucopenia Virus (PLI IV),FeL V Recombinant canarypox Virus (vCP97),Feline Leukaemia vCP97	Stungulyfsstofn og leysir, dreifa		QI06AJ	Á ekki við	Nei	
Quadrisol	Vedaprofenum INN	Hlaup til inntöku	100 mg/ml	QM01AE90	Kjöt og innmatur: 12 sólarhringar.Dýralyfið má ekki gefa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
RABIGEN SAG2	Isotonic solution containing the attenuated rabies virus	Mixtúra, dreifa		QI07BD	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Rabitec		Mixtúra, dreifa		QI07BD		Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Recicort vet.	Triamcinolonum INN acetóníð,Acidum salicylicum	Eyrnadropar	1,77 mg/ml +17,7 mg/ml	QD07XB02	Á ekki við.	Já	
Recocam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar, mjólk: 5 sólarhringar Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Reconcile	Fluoxetineum INN	Tuggutafla	16 mg	QN06AB03	Á ekki við	Nei	
Reconcile	Fluoxetineum INN	Tuggutafla	32 mg	QN06AB03	Á ekki við	Nei	
Reconcile	Fluoxetineum INN	Tuggutafla	64 mg	QN06AB03	Á ekki við	Nei	
Reconcile	Fluoxetineum INN	Tuggutafla	8 mg	QN06AB03	Á ekki við	Nei	
Repose vet	Pentobarbitalum INN natríum	Stungulyf, lausn	500 mg/ml	QN51AA01		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
RESPIPORC FLU3	Inactivated Influenza A virus/swine/Bakum/IDT1769/2003 (H3N2),Inactivated Influenza A virus/swine/Haselünne/IDT2617/2003(H1N1),Inactivated Influenza A virus/swine/1832/2000 (H1N2)	Stungulyf, dreifa		QI09AA03	Núll dagar	Nei	
RESPIPORC FLUpan H1N1	Influenza Virus Type A H1N1	Stungulyf, dreifa		QI09AA03	Núll dagar.	Nei	
Rheumocam	Meloxicamum INN	Kyrni	330 mg	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Nei	
Rheumocam	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	0,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Rheumocam	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	1,5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við	Já	
Rheumocam	Meloxicamum INN	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml	QM01AC06	Kjöt og innmatur: 3 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	
Rheumocam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Hestar: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa hestum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Rheumocam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Á ekki við.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Rheumocam	Meloxicamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QM01AC06	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar. Svín: Kjöt og innmatur: 5 sólarhringar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Rheumocam	Meloxicamum INN	Tuggutafla	1 mg	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Rheumocam	Meloxicamum INN	Tuggutafla	2,5 mg	QM01AC06	Á ekki við	Nei	
Rhiniseng	Bordetella bronchiseptica óvirk, Pasteurella multocida toxin (PMTr)	Stungulyf, dreifa		QI09AB04	Núll dagar	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Romefen vet.	Ketoprofenum INN	Stungulyf, lausn	100 mg/ml	QM01AE03	Nautgripir: sláturafurðir 1 sólarhringur eftir inndælingu í bláæð. 4 sólarhringar eftir gjöf í vöðva. Nautgripir mjólk 0 klukkustundir. Hestar: sláturafurðir 1 sólarhringur. Svín: sláturafurðir 4 sólarhringar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Rominervin	ROMIFIDINE HYDROCHLORIDE	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN05CM93	Kjöt og innmatur: 6 sólarhringar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Rompun vet.	Xylazinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QN05CM92	Sláturafurðir: 1 sólarhringur.Mjólk: Núll dagar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Saniotic vet.	Miconazolum INN níturat,Prednisolonum INN acetat,Polymyxinum B INN súlfat	Eyrnadropar/húðdreifa	5,0 mg/0,5293 mg/23,0 mg/ml	QS02CA01	Á ekki við.	Já	
Sebacil vet.	Phoximum INN	Húðlausn	500 mg/ml	QP53AF01	Kjöt og innmatur: Sauðfé: 42 sólarhringar. Svín: 10 sólarhringar. Mjólk: Ekki má nota lyfið handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Já	
Sedadex	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,1 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Sedadex	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	0,5 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Sedaman vet	Magnesii sulfas	Stungulyf, lausn	200 mg/ml	QA12CC02	Biðtími: Kjöt, innmatur og mjólk: Núll sólarhringar.	Já	
Selevitan, vet.	Natrii selenis, Tocopherolum (alfa) acetat	Stungulyf, lausn		QA12CE99	Sláturafurðir: 30 sólarhringar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Semintra	Telmisartanum INN	Mixtúra, lausn	10 mg/ml	QC09CA07	Á ekki við	Nei	
Semintra	Telmisartanum INN	Mixtúra, lausn	4 mg/ml	QC09CA07	Á ekki við	Já	
Seresto vet.	Imidaclopridum INN, Flumethrin	Lyfjahálsól	1,25 g / 0,56 g	QP53AC55	Á ekki við.	Nei	
Seresto vet.	Imidaclopridum INN, Flumethrin	Lyfjahálsól	1,25 g / 0,56 g	QP53AC55	Á ekki við.	Já	
Seresto vet.	Imidaclopridum INN, Flumethrin	Lyfjahálsól	1,25 g / 0,56 g	QP53AC55	Á ekki við.	Nei	
Seresto vet.	Imidaclopridum INN, Flumethrin	Lyfjahálsól	4,5 g / 2,03 g	QP53AC55	Á ekki við.	Já	
SevoFlo	Sevofluranum INN	Innöndunargufa, vökvi		QN01AB08	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Sevohale	Sevofluranum INN	Innöndunargufa, vökvi	100 %	QN01AB08	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Sileo	Dexmedetomidinum INN hýdróklóríð	Munnholshlaup	0,1 mg/ml	QN05CM18	Á ekki við.	Já	
Simparica	Sarolanerum INN	Tuggutafla	10 mg	QP53BE03	Á ekki við.	Nei	
Simparica	Sarolanerum INN	Tuggutafla	120 mg	QP53BE03	Á ekki við.	Nei	
Simparica	Sarolanerum INN	Tuggutafla	20 mg	QP53BE03	Á ekki við.	Nei	
Simparica	Sarolanerum INN	Tuggutafla	40 mg	QP53BE03	Á ekki við.	Nei	

Heiti dýrallyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Simparica	Sarolanerum INN	Tuggutafla	5 mg	QP53BE03	Á ekki við.	Nei	
Simparica	Sarolanerum INN	Tuggutafla	80 mg	QP53BE03	Á ekki við.	Nei	
SLICE Vet.	Emamectin benzoate	Forblanda fyrir lyfjablandað fóður	0.2 %	QP54AA06	Núll dagar. Til að tryggja að lyfjaleifar fari ekki yfir MRL (Maximum Residue Limit), má ekki meðhöndla fisk oftari en einu sinni 60 dögum áður en byrjað er að veiða fiska sem nýta á til manneldis.	Já	
Solupam	Diazepamum INN	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QN05BA01		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Spasmipur vet.	Hyoscinebutylbromide	Stungulyf, lausn	20 mg/ml	QA03BB01	Kjöt og innmatur: Hestar 3 dagar, nautgripir 2 dagar, sauðfé 18 dagar, svín 9 dagar Mjólk: Hestar, nautgripir og sauðfé 12 klukkustundir	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Spasium vet.	Metamizolum natricum INN, Butylscopolamini bromidum NFN	Stungulyf, lausn	500 mg/ml + 4 mg/ml	QA03DB04	Biðtími: Kjöt og innmatur: Hestar, nautgripir (i.v.) 12 dagar Svín (i.m.) 15 dagar Mjólk: Nautgripir (i.v.) 4 dagar Dýrallyfið er ekki viðurkennt til notkunar. Notið ekki handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Spizobactin-L	SPIRAMYCIN, Metronidazolum INN	Tuggutafla	3.000.000 a.e. / 500 mg	QJ51RF01		Nei	
Spizobactin-M	SPIRAMYCIN, Metronidazolum INN	Tuggutafla	1.500.000 a.e. / 250 mg	QJ51RF01		Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Spizobactin-S	SPIRAMYCIN, Metronidazolium INN	Tuggutafla	750.000 a.e. / 125 mg	QJ51RF01		Nei	
Sporimune vet.	Ciclosporinum INN	Mixtúra, lausn	50 mg/ml	QL04AD01	Á ekki við	Nei	
STARTVAC	Escherichia coli J5 inactivated, Staphylococcus aureus inactivated	Stungulyf, fleyti		QI02AB	Núll dagar.	Já	
Stellamune One Vet.	Mycoplasma hyopneumoniae óvirk	Stungulyf, fleyti		QI09AB13	Núll dagar	Já	
Streptocillin vet.	Benzylpenicillinprocainum, Dihydro streptomycinum INN súlfat	Spenalyf, smyrsl		QJ51RC23	Sláturafurðir: 6 sólarhringar. Mjólk: 5 sólarhringar fyrir meðhöndlaðan mjólkurkirtil, 1 sólarhringur fyrir ómeðhöndlaðan mjólkurkirtil.	Já	
Streptocillin vet.	Benzylpenicillinprocainum, Dihydro streptomycinum INN súlfat	Stungulyf, dreifa		QJ01RA01	Sláturafurðir: 60 sólarhringar. Mjólk: 3 sólarhringar.	Já	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	120 mg	QP54AA05	Á ekki við	Já	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	15 mg	QP54AA05	Á ekki við	Já	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	240 mg	QP54AA05	Á ekki við	Já	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	30 mg	QP54AA05	Á ekki við	Já	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	360 mg	QP54AA05	Á ekki við	Nei	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	45 mg	QP54AA05	Á ekki við	Já	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	60 mg	QP54AA05	Á ekki við	Nei	
Stronghold	Selamectinum INN	Blettunarlausn	60 mg	QP54AA05	Á ekki við	Já	
Stronghold Plus	Selamectinum INN, Sarolanerum INN	Blettunarlausn	15 mg/2,25 mg	QP54AA05	Á ekki við	Nei	
Stronghold Plus	Sarolanerum INN, Selamectinum INN	Blettunarlausn	30 mg/5 mg	QP54AA05	Á ekki við	Nei	
Stronghold Plus	Selamectinum INN, Sarolanerum INN	Blettunarlausn	60 mg/10 mg	QP54AA05	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Suiseng Vet	Escherichia coli F4ab fimbrial adhesin, Escherichia coli F4ac fimbrial adhesin, Escherichia coli F5 fimbrial adhesin, Escherichia coli F6 fimbrial adhesin, Escherichia coli LT enterotoxoid, Clostridium perfringens Type-C Beta Toxoid, Clostridium novyi toxoid	Stungulyf, dreifa		QI09AB08	Núll dagar	Já	
Suivac APP Vet.	ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE SEROTYPE 2, INACTIVATED, ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE SEROTYPE 9, INACTIVATED, TOXOID APX I, TOXOID APX II, TOXOID APX III	Stungulyf, fleyti	1-10 ein.	QI09AB07	Biðtími: 0 dagar.	Nei	
Suprelorin	Deslorelinum INN acetat	Vefjalyf	4,7 mg	QH01CA93	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D). enda sé lyfinu ætíð vísað á nafn dýralæknis til nota í starfi. D merkt í lyfjaskrá.
Suprelorin	Deslorelinum INN acetat	Vefjalyf	9,4 mg	QH01CA93	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D). enda sé lyfinu ætíð vísað á nafn dýralæknis til nota í starfi. D merkt í lyfjaskrá.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Live Aujeszky Virus Strain NIA-783	Stungulyf, fleyti		QI09AD01	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Suvaxyn Circo	Porcine Circovirus Type 2 Orf-2 protein	Stungulyf, fleyti		QI09AA07	Núll dagar	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Suvaxyn Circo+MH RTU	Mycoplasma hyopneumoniae óvirk, Recombinant Porcine Circovirus Type 1 expressing the Porcine Circovirus Type 2 ORF2 protein	Stungulyf, fleyti		QI09AL	Núll dagar.	Já	
Suvaxyn CSF Marker	Classical Swine Fever E2 recombinant BVDV (CP7-E2A1f)	Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI09AD04	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi. Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Suvaxyn PCV	Porcine Circovirus recombinant virus (cPCV) 1-2 inactivated	Stungulyf, dreifa		QI09AA07	Núll dagar	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Suvaxyn PRRS MLV	porcine respiratory and reproductive syndrome virus, live	Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI09AD03	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Sympagesic	Metamizolum natricum INN, Hyoscinebutylbromide	Stungulyf, lausn		QA03DB04	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 18 sólarhringar eftir i.v gjöf - 28 sólarhringar eftir i.m gjöf - Ekki handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneidis. Má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneidis. Hestar: Kjöt og innmatur: 15 sólarhringar- Ekki handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneidis. Má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð ef nota á mjólkina til manneidis. Svín: kjöt og innmatur: 15 sólarhringar	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Syncrostim	Gonadotrophinum sericum INN	Frostþurrkað stungulyf, lausn	500 a.e.	QG03GA03	Kjöt og innmatur: Núll dagar. Mjólk: Núll dagar.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Synthadon	Methadonum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN02AC52	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Synthadon	Methadonum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	5 mg/ml	QN02AC52	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Syvazul BTV	Inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1, Inactivated bluetongue virus, serotype 4, strain SPA-1/2004, Bluetongue virus inactivated serotype 8 strain BTV8/Bel/2006	Stungulyf, dreifa		QI04AA02		Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Temprace Vet	Acepromazinum INN maleat	Stungulyf, lausn	0,5 mg/ml	QN05AA04		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Thiafeline vet.	Thiamazolum INN	Filmuhúðuð tafla	2,5 mg	QH03BB02	Á ekki við	Nei	
Thiafeline vet.	Thiamazolum INN	Filmuhúðuð tafla	5 mg	QH03BB02	Á ekki við	Nei	
Thyroxani vet	Levothyroxinum INN natríum	Tafla	200 míkróg	QH03AA01	Á ekki við.	Nei	
Thyroxani vet	Levothyroxinum INN natríum	Tafla	600 míkróg	QH03AA01	Á ekki við.	Nei	
Torphadine vet.	Butorphanolum INN tartrat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN02AF01	Kjöt og innmatur: núll dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa mjólkandi hryssum sé mjólkinn nýtt til manneldis.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Torphasol vet	Butorphanolum INN tartrat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN02AF01	Kjöt og innmatur: núll dagar. Mjólk: núll dagar.	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Tralieve Vet	Tramadolum INN hýdróklóríð	Stungulyf, lausn	50 mg/ml	QN02AX02		Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Tralieve Vet	Tramadolum INN hýdróklóríð	Tuggutafla	20 mg	QN02AX02		Nei	
Tralieve Vet	Tramadolum INN hýdróklóríð	Tuggutafla	80 mg	QN02AX02		Nei	
Tranquigel	Acepromazinum INN maleat	Hlaup til inntöku	35 mg/g	QN05AA04		Nei	
Tranquinervin Vet	Acepromazinum INN maleat	Stungulyf, lausn	10 mg/ml	QN05AA04	Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa hestum sem eru ætluð til manneidis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Tribrissen vet.	Sulfadiazinum INN, Trimethoprimum INN	Stungulyf, dreifa		QJ01EW10	Nautgripir Kjöt og innmatur: 19 sólarhringar (i.v.) Mjólk: 7 sólarhringar Hestar Kjöt og innmatur: Má ekki nota handa hestum sem eru notaðir til manneidis Mjólk: Má ekki nota handa hestum ef mjólkin er notuð til manneidis Svín Kjöt og innmatur: 30 sólarhringar (i.m.)	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Tricaine Pharmaq	Tricaine Methane Sulfonate	Baðduft til meðhöndlunar fiska, lausn	1000 mg/g	QN01AX93	Fiskinum má ekki slátra til manneldis meðan á meðferð stendur. Eingöngu má slátra fiskinum til manneldis 70 gráðudögum eftir síðustu meðferð.	Já	
Trocoxil	Mavacoxibum INN	Tuggutafla	20 mg	QM01AH92	Á ekki við.	Nei	
Trocoxil	Mavacoxibum INN	Tuggutafla	30 mg	QM01AH92	Á ekki við.	Já	
Trocoxil	Mavacoxibum INN	Tuggutafla	6 mg	QM01AH92	Á ekki við.	Já	
Trocoxil	Mavacoxibum INN	Tuggutafla	75 mg	QM01AH92	Á ekki við.	Já	
Trocoxil	Mavacoxibum INN	Tuggutafla	95 mg	QM01AH92	Á ekki við.	Já	
UBAC	Lipoteichoic-sýra (LTA) úr BAC-þætti (Biofilm Adhesion Component) Streptococcus uberis, stofn 5616	Stungulyf, fleyti		QI02AB	Núll dagar	Nei	
Uniferon	Ferri hydroxidum dextran komplex	Stungulyf, lausn	200 mg/ml	QB03AC	Núll dagar.	Já	
UpCard	Torasemidum INN	Tafla	0,75 mg	QC03CA04	Á ekki við.	Nei	
UpCard	Torasemidum INN	Tafla	18 mg	QC03CA04	Á ekki við.	Nei	
UpCard	Torasemidum INN	Tafla	3 mg	QC03CA04	Á ekki við.	Nei	
UpCard	Torasemidum INN	Tafla	7,5 mg	QC03CA04	Á ekki við.	Nei	
VarroMed	Formic acid,Oxalic acid dihydrate	Ördreifa	5 mg/ml + 44 mg/ml	QP53AG	Hunang: 0 dagar	Nei	
VarroMed	Oxalic acid dihydrate,Formic acid	Ördreifa	75 mg+ 660 mg	QP53AG	Hunang: 0 dagar	Nei	
Vaxxitek HVT + IBD	vHVT013-69 component	Stungulyf, dreifa		QI01AD15	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Vectormune ND	Live recombinant HVT, with ND	Dreifa og leysir fyrir stungulyf, dreifa		QI01AD	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Vectra 3D	Dinotefuran,Pyriproxyfen,Permethrinum INN	Blettunarlausn	54 mg/ml + 4,84 mg/ml + 397 mg/ml	QP53AC54	Á ekki við	Nei	
Vectra Felis	Dinotefuran,Pyriproxyfen	Blettunarlausn	423 mg/42,3 mg	QP53AX73	Á ekki við	Nei	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
VEPURED	recombinant verotoxin 2e	Stungulyf, dreifa		QI09AB02	Núll dagar	Nei	
Veraflox	Pradofloxacinum INN	Mixtúra, dreifa	25 mg/ml	QJ01MA97	Á ekki við	Nei	
Veraflox	Pradofloxacinum INN	Tafla	120 mg	QJ01MA97	Á ekki við	Nei	
Veraflox	Pradofloxacinum INN	Tafla	15 mg	QJ01MA97	Á ekki við	Nei	
Veraflox	Pradofloxacinum INN	Tafla	60 mg	QJ01MA97	Á ekki við	Nei	
Versican Plus DHPPi	Canine Distemper virus, strain CDV Bio 11/A, Canine Adenovirus, strain CAV2-Bio 13, Canine Parvovirus, strain CPV2b-Bio 12 /B, Canine Parainfluenza Type 2 virus, strain CPiV2-Bio15	Frostpurkað stungulyf og leysir, dreifa		QI07AD04	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Versican Plus DHPPi/L4	Canine Distemper virus, strain CDVU 39, Canine Adenovirus, strain CAV2-Bio 13, Canine Parvovirus, strain CPV2b-Bio 12 /B, Canine Parainfluenza Type 2 virus, strain CPiV2-Bio15, Inactivated Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Leptospira interrogans serovar Bratislava, strain MSLB 1088, Inactivated Leptospira interrogans canicola, strain MSLB 1090, Inactivated Leptospira kirschneri grippotyphosa, strain MSLB 1091, Inactivated rabies virus, strain SAD Vnukovo-32	Frostpurkað stungulyf og leysir, dreifa		QI07AI02	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Versican Plus DHPPi/L4R	Canine Distemper virus, strain CDVU 39, Canine Adenovirus, strain CAV2-Bio 13, Canine Parvovirus, strain CPV2b-Bio 12 /B, Canine Parainfluenza Type 2 virus, strain CPiV2-Bio15, Inactivated Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Leptospira interrogans serovar Bratislava, strain MSLB 1088, Inactivated Leptospira interrogans canicola, strain MSLB 1090, Inactivated Leptospira kirschneri grippotyphosa, strain MSLB 1091, Inactivated rabies virus, strain SAD Vnukovo-32	Frostpurrað stungulyf og leysir, dreifa		QI07AJ06	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Versican Plus L4	Inactivated Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Inactivated Leptospira interrogans serovar Bratislava, strain MSLB 1088, Inactivated Leptospira interrogans canicola, strain MSLB 1090, Inactivated Leptospira kirschneri grippotyphosa, strain MSLB 1091	Stungulyf, dreifa		QI07AB01	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Versican Plus Pi	Canine Parainfluenza Type 2 virus, strain CPiV2-Bio15	Frostpurrað stungulyf og leysir, dreifa		QI07AD08	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Versican Plus Pi/L4	Canine Parainfluenza Type 2 virus, strain CPiV2-Bio15, Inactivated Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Inactivated Leptospira interrogans canicola, strain MSLB 1090, Inactivated Leptospira kirschneri grippotyphosa, strain MSLB 1091	Frostpurrrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI07AI08	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Versican Plus Pi/L4R	Canine Parainfluenza Type 2 virus, strain CPiV2-Bio15, Inactivated Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Inactivated Leptospira interrogans serovar Bratislava, strain MSLB 1088, Inactivated Leptospira interrogans canicola, strain MSLB 1090, Inactivated Leptospira kirschneri grippotyphosa, strain MSLB 1091, Inactivated rabies virus, strain SAD Vnukovo-32	Frostpurrrkað stungulyf og leysir, dreifa		QI07AJ	Á ekki við	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Vetergesic vet.	Buprenorphinum INN	Stungulyf, lausn	300 míkrog/ml	QN02AE01	Á ekki við	Já	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Vetmedin vet.	Pimobendanum INN	Stungulyf, lausn	0,75 mg/ml	QC01CE90	Á ekki við	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).
Vetmedin vet.	Pimobendanum INN	Tuggutafla	1,25 mg	QC01CE90	Á ekki við.	Já	
Vetmedin vet.	Pimobendanum INN	Tuggutafla	10 mg	QC01CE90	Á ekki við.	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Vetmedin vet.	Pimobendanum INN	Tuggutafla	2,5 mg	QC01CE90	Á ekki við.	Nei	
Vetmedin vet.	Pimobendanum INN	Tuggutafla	5 mg	QC01CE90	Á ekki við.	Já	
Vetrimoxin L.A.	Amoxicillinum INN trínhýdrat	Stungulyf, dreifa	150 mg/ml	QJ01CA04	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 18 dagar Mjólk: 3 dagar Svín: Kjöt og innmatur: 20 dagar	Já	
Virbagen Omega	Recombinant Omega Interferon of Feline Origin	Stungulyfsstofn og leysir, dreifa		QL03AB	Á ekki við	Nei	
Virbagen Omega	Recombinant Omega Interferon of Feline Origin	Stungulyfsstofn og leysir, dreifa		QL03AB	Á ekki við	Nei	
Vulketan vet	Ketanserinum INN tartrat	Hlaup	2,5 mg/g	QD03AX90	Kjöt og innmatur: Núll dagar. Mjólk: Núll klukkustundir.	Nei	
Welpan vet	Febantel,Pyrantel Embonate	Mixtúra, dreifa	15 mg/ml +5 mg/ml	QP52AC55	Á ekki við	Nei	
Ypozane	Osateronum INN acetat	Tafla	1,875 mg	QG04CX90	Á ekki við	Já	
Ypozane	Osateronum INN acetat	Tafla	15 mg	QG04CX90	Á ekki við	Já	
Ypozane	Osateronum INN acetat	Tafla	3,75 mg	QG04CX90	Á ekki við	Já	
Ypozane	Osateronum INN acetat	Tafla	7,5 mg	QG04CX90	Á ekki við	Já	
Zactran	Gamithromycinum INN	Stungulyf, lausn	150 mg/ml	QJ01FA95	Nautgripir: Kjöt og innmatur: 64 dagar. Dýralyfið má ekki gefa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneldis. Notið ekki handa kálffullum kúm eða kvígum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólk þeirra til manneldis. Sauðfé: Kjöt og innmatur 29 dagar. Svín: Kjöt og innmatur: 16 dagar.	Nei	
Zantel Cat & Dog	Praziquantelum INN,Fenbendazolum INN	Tafla	50 mg /500 mg	QP52AA51	Á ekki við	Já	

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Zeleris	Florfenicol INN, Meloxicam INN	Stungulyf, lausn	400 mg/ml + 5 mg/ml	QJ01BA90	Kjöt og innmatur: 56 sólarhringar. Mjólk: Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til mannelis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum kúm 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til mannelis.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D). enda sé lyfinu ætíð vísað á nafn dýralæknis til nota í starfi. D merkt í lyfjaskrá.
Zerofen 10% vet.	Fenbendazolum INN	Mixtúra, dreifa	10 %	QP52AC13	Sauðfé: sláturafurðir: 21 sólarhringur. Nautgripir: sláturafurðir: 14 sólarhringar. Mjólk: 4 sólarhringar.	Já	
Zolvix	Monepantelum INN	Mixtúra, lausn	25 mg/ml	QP52AX09	7 dagar. Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til mannelis.	Nei	
Zulvac 1 Bovis	BTV-1 strain BTV-1/ALG2006/01E1	Stungulyf, dreifa		QI02AA08	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Zulvac 1 Ovis	BTV-1 strain BTV-1/ALG2006/01E1	Stungulyf, dreifa		QI04AA02	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Zulvac 1+8 Bovis	BTV-1 strain BTV-1/ALG2006/01E1, Inactivated Blue Tongue Virus serotype 8 strain BTV-8/BEL2006/02	Stungulyf, dreifa		QI02AA08	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Zulvac 1+8 Ovis	BTV-1 strain BTV-1/ALG2006/01E1, BTV-8 strain BTV-8/BEL2006/02	Stungulyf, dreifa		QI04AA02	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Zulvac 8 Bovis	Inactivated Blue Tongue Virus serotype 8 strain BTV-8/BEL2006/02	Stungulyf, dreifa		QI02AA08	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Zulvac 8 Ovis	Inactivated Blue Tongue Virus serotype 8 strain BTV-8/BEL2006/02	Stungulyf, dreifa		QI04AA02	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.

Heiti dýralyfs	Virkt efni	Lyfjaform	Styrkleiki	ATC fl.	Afurðanýting	Markaðs sett	Ýmsar upplýsingar
Zulvac BTV Ovis	Inactivated Blue Tongue Virus serotype 8 strain BTV-8/BEL2006/02, Inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1, Inactivated bluetongue virus, serotype 4, strain SPA-1/2004	Stungulyf, dreifa		QI02AA	Núll dagar	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi.
Zulvac SBV	Inactivated Schmallenberg virus	Stungulyf, dreifa		QI02AA	Núll dagar.	Nei	Innflutningur og sala óheimil á Íslandi. Lyfið má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknirinn gefur það sjálfur (D)
Zuprevo	Tildipirosinum INN	Stungulyf, lausn	180 mg/ml	QJ01FA	Nautgripir (kjöt og innmatur): 47 dagar Dýralyfið er ekki leyft til notkunar handa mjólkandi dýrum sé mjólkinn nýtt til manneidis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneidis.	Nei	
Zuprevo	Tildipirosinum INN	Stungulyf, lausn	40 mg/ml	QJ01FA	Kjöt og innmatur: 9 dagar.	Nei	
Zycortal	Desoxycortonum INN pivalat	Stungulyf, forðadreifa	25 mg/ml	QH02AA03	Á ekki við.	Nei	Lyf sem má eingöngu nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur það sjálfur (D).